Curilen®

Bisoprolol fumarate + Acetylsalicylic acid

Βισοπρολόλη
5 mg / 10 mg

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ
100 mg

στεφανιαία νόσος
στεφανιαία νόσος
στεφανιαία νόσος
στεφανιαία νόσος
στεφανιαία
υπέρταση
υπέρταση υπέρταση
υπέρταση
υπέρταση υπέρταση υπέρταση

30 σκληρά καψάκια
Curilen®
Bisoprolol fumarate + Acetylsalicylic acid
5mg
100mg
UNI-PHARMA
30 σκληρά καψάκια
Curilen®
Bisoprolol fumarate + Acetylsalicylic acid
10mg
100mg
UNI-PHARMA

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S P C)

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CURILEN® Καψάκιο, σκληρό 5 mg/100 mg. CURILEN® Καψάκιο, σκληρό 10 mg/100 mg. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 5 mg ή 10 mg Bisoprolol fumarate και 100 mg Acetylsalicylic acid. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Καψάκιο, σκληρό. **4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Για τη θεραπεία της υπέρτασης σε ασθενείς που είναι ήδη σταθεροποιημένοι με μονοθεραπείες. Για τη θεραπεία της στηθάγχης σε ασθενείς που είναι ήδη σταθεροποιημένοι με μονοθεραπείες. **Δοσολογία:** Ένα καψάκιο ανά ημέρα. Η θεραπεία με bisoprolol δεν πρέπει να διακόπτεται απότομα καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή επιδείνωση της πάθησης, ειδικά σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή νόσο. **Αντενδείξεις:** Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια ή κατά τη διάρκεια επεισοδίων μη αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρκειας, που απαιτούν ενδοφλέβια ινότροπη θεραπεία. Καρδιογενές σοκ. Κατά το θηλασμό. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ μπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασμο και κρίσεις άσθματος ή άλλες αντιδράσεις υπερευαισθησίας. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα, κόπωση, ζάλη, κεφαλαλγία, ψυχρά άκρα ή αιμωδίες, [illegible] Λ.Τ. 5/100 mg: 8.16 €, 10/100 mg: 8.18 €.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"